



©

ACİL DURUM BİLGİLERİ

Çocuklarla İlgili Acil Durumlar

Oğlumun ağzına bir raket çarptı ve ön kalıcı dişi yerinden çıkı. Ne yapabilirim?

Çocuğunuzun olayın gerçekleşmesinden sonraki bir saat içinde diş hekimine götürmelisiniz. Eğer daha fazla beklerseniz, dişin başarılı bir şekilde yerine yerleştirilme şansı azalacaktır. Soğuk su ile ağzını çalkalayın ama silmeyin yada fıçalamayın. Dişi bir bardak su yada sütün içine koyun yada diş hekimine gidene dek temiz, nemli bir bezin içinde saklayın. Yerinden çıkan dişler için neredeyse her zaman kanal tedavisi gerekir ancak olayı takip eden bir saat içinde tedavi edilebilirse yıllarca korunabilirler.

Çocuğunuzun gelecekte böyle bir durumdan korumak için diş hekiminizden, çocuğunuzun ağzına bir koruyucu yapmasını isteyin ve spor yaparken bunu kullanmasını sağlayınız.

Çocuğum düştü ve ön bebek dişini vurdu ve diş koyu bir renk aldı. Artık o diş öldü mü?

Renk bozukluğu, darbenin dişin kökünün ucundaki bir kan damarını koparması anlamına gelebilir. Ümit verici bir durum ise, bebek dişleri yetişkinlerin aksine genellikle kalıcı bir dişi öldürebilecek darbelerden kurtarır. Çocuğunuzun hemen diş hekiminize götürüp dişin incelenmesini sağlayınız.

Çocuğum ön dişini kırdı. Bunu tamir etmek zor mudur ve ne kadar zaman alır?

Eğer kırılan parçayı bulursanız bunu diş hekiminize getirin. Bu parça genellikle dişe yeniden yapıştırılabilir. Kırık parça olmasa bile diş hekimi dişi eski haline bir saat içinde getirebilir.

Çocuğumun dişi ağrıdığında ne yapmalıyım?

Derhal diş hekiminizi arayın. Önerimiz, çocuğunuzun tedaviye getirilene kadar ağzını ılık su ile çalkalamanızı ve yüzüne içine buz sarılmış bez bastırmanızdır. Diğer bir önemli konuda sıcak uygulama **YAPILMAMASIDIR**. Ayrıca hiçbir zaman diş yada diş eti üzerine **ASPIRİN KOYMAMALISINIZ**. Aspirin asidiktir ve diş yada diş eti üzerine konulduğunda yanığa neden olabilir. Eğer aspirin kullanacaksınız, yuttuğundan emin olun. Son olarak da şunu bilmek gerekir ki diş ağrısından şikayet eden çocuklarda çoğu kez dişler arasına yemek parçası sıkışmıştır. İlgili diş arasını yumuşak bir şekilde diş ipi ile temizlerseniz bir rahatlama elde edebilirsiniz.

Çocuğumun dişine bir zarar gelmesini nasıl engellerim?

Eğer çocuğunuz yürümeye yeni başlamışsa, bu konuda hazırlıklı olduğundan emin olun. Mobilyadaki sivri köşeler yada delici kollar ve tutma yerleri kapatılmalı, eğer bu yapılamıyorsa bu tür mobilyalı odalar kilitlemelidir. Çocuğunuzun arabada tuttuğunuz zamanda sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Arabadayken hiçbir zaman çocuğunuzun koltukta ayakta durmasına izin vermeyin ve kucağınızda tutmayınız.

Daha ileri yaşlardaki çocuklarda ağız koruyucular yaralanmaları engelleyebilir. Pek çok diş yaralanmaları jimnastik salonunda yada oyun alanında değil, yakınımızda olur; bu nedenle ağız koruyucu, arka bahçenizde bile olsa sert oyunlar sırasında takılmalıdır.

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...

BÜYÜYEN ÇOCUKTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ORTODONTİK PROBLEMLER



Yer Darlığı



Diş Aralarının Fazla Açık Olması



Alt Çenenin Geride Kalması



Ters Kapanış



Derin Kapanış



Açık Kapanış



Dil İtmi



Parmak Emme ve Açık Kapanış



Üst Çene Darlığı



Üst Çenenin İleri İtmi



Çapraşıklık ve Diastema



Parmak Emme

Çocuğunuzda, yukarıda belirttiğimiz problemleri fark ederseniz, ortodontiste başvurmalısınız.

- Erken veya geç süt dişi kaybı
- Çiğneme zorluk
- Ağız solunumu
- Çenelerin açılıp kapanma esnasında ses çıkarması
- Konuşma zorlukları
- Yanakların ısırılması veya dişlerin damağa çarpması
- Yüzde simetri bozukluğu
- Dişlerin anormal sıkılması

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...

Daha fazla bilgi için www.ortodontist.com ziyaret ediniz.



©

Çocuğunuz 7 Yaşını geçirmeden ilk Ortodonti Muayenesini olmalıdır.

Sebepleri

- Süt dişleri henüz ağızda iken; çene büyümesi veya sürmekte olan dişler ile ilgili problemleri Ortodonti Uzmanı veya diş hekimi tespit edebilir.
- Çocuğunuzun dişleri sizce düzgün olmasına rağmen, Ortodonti Uzmanının fark edeceği bir problemi olabilir.
- Çocuğunuzun ortodontik amaçlı kontrole getirdiğinizde, herhangi bir problemi olmadığı ortaya çıkabilir. Ancak büyüme ile birlikte ortaya çıkabilecek bir problem teşhis edilirse, Ortodontistiniz sizi izlemeye alacaktır. Amaç; uygun zamanda müdahale ederek, ideal sonucu yakalamaktır.
- Erken dönem müdahale sayesinde problemler daha da büyümeden, daha kısa süreli ve daha basit müdahalelerle çözülebilir.
- Erken tedavi sayesinde;
 - Çene büyümesini yönlendirme
 - Dişlek tabir edilen ağızlarda düşme sonucu olabilecek diş kırılmalarının, dişin yuvasından çıkmasının engellenmesi
 - Kötü alışkanlıkların giderilmesi
 - Dişlerin daha düzgün hale getirilmesi
 - Düzgün ve güzel bir yüz yaratılması sağlanır.

Erken Müdahale sayesinde çocuğunuza, sağlıklı ve güzel bir gülümseme sağlamış olacaksınız.

Çocuğunuz 7 Yaşını geçirmeden ilk Ortodonti Muayenesini olmalıdır.

Ortodonti Uzmanın görevi; en uygun zamanda, en uygun müdahale ile çocuğunuzun değişen ağız ve yüz yapısında en iyiye kavuşmasını sağlamaktır.

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...

64 Ada Kamelya 2-3 D:1-2-4
Ataşehir / İSTANBUL / TR
e-mail:ortodontist@ortodontist.com
www.ortodontist.com
Tel: 0216 456 02 56 pbx
Fax: 0216 455 26 49

www.ortodontist.com



Member
American Association of
Orthodontists



©

ACİL DURUM BİLGİLERİ

Çocuklarla İlgili Acil Durumlar

Oğlumun ağzına bir raket çarptı ve ön kalıcı dişi yerinden çıktı. Ne yapabilirim?

Çocuğunuzun olayın gerçekleşmesinden sonraki bir saat içinde diş hekimine götürmelisiniz. Eğer daha fazla beklerseniz, dişin başarılı bir şekilde yerine yerleştirilme şansı azalacaktır. Soğuk su ile ağzını çalkalayın ama silmeyin yada fıçalamayın. Dişi bir bardak su yada sütün içine koyun yada diş hekimine gidene dek temiz, nemli bir bezin içinde saklayın. Yerinden çıkan dişler için neredeyse her zaman kanal tedavisi gerekir ancak olayı takip eden bir saat içinde tedavi edilebilirse yıllarca korunabilirler.

Çocuğunuzun gelecekte böyle bir durumdan korumak için diş hekiminizden, çocuğunuzun ağzına bir koruyucu yapmasını isteyin ve spor yaparken bunu kullanmasını sağlayınız.

Çocuğum düştü ve ön bebek dişini vurdu ve diş koyu bir renk aldı. Artık o diş öldü mü?

Renk bozukluğu, darbenin dişin kökünün ucundaki bir kan damarını koparması anlamına gelebilir. Ümit verici bir durum ise, bebek dişleri yetişkinlerin aksine genellikle kalıcı bir dişi öldürebilecek darbelerden kurtarır. Çocuğunuzun hemen diş hekiminize götürüp dişin incelenmesini sağlayınız.

Çocuğum ön dişini kırdı. Bunu tamir etmek zor mudur ve ne kadar zaman alır?

Eğer kırılan parçayı bulursanız bunu diş hekiminize getirin. Bu parça genellikle dişe yeniden yapıştırılabilir. Kırık parça olmasa bile diş hekimi dişi eski haline bir saat içinde getirebilir.

Çocuğumun dişi ağrıdığına ne yapmalıyım?

Derhal diş hekiminizi arayın. Önerimiz, çocuğunuzun tedaviye getirilene kadar ağzını ılık su ile çalkalamanızı ve yüzüne içine buz sarılmış bez bastırmanızdır. Diğer bir önemli konuda sıcak uygulama **YAPILMAMASIDIR**. Ayrıca hiçbir zaman diş yada diş eti üzerine **ASPIRİN KOYMAMALISINIZ**. Aspirin asidiktir ve diş yada diş eti üzerine konulduğunda yanığa neden olabilir. Eğer aspirin kullanacaksınız, yuttuğundan emin olun. Son olarak da şunu bilmek gerekir ki diş ağrısından şikayet eden çocuklarda çoğu kez dişler arasına yemek parçası sıkışmıştır. İlgili diş arasını yumuşak bir şekilde diş ipi ile temizlerseniz bir rahatlama elde edebilirsiniz.

Çocuğumun dişine bir zarar gelmesini nasıl engellerim?

Eğer çocuğunuz yürümeye yeni başlamışsa, bu konuda hazırlıklı olduğundan emin olun. Mobilyadaki sivri köşeler yada delici kollar ve tutma yerleri kapatılmalı, eğer bu yapılamıyorsa bu tür mobilyalı odalar kilitlemelidir. Çocuğunuzun arabada tuttuğunuz zamanda sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Arabadayken hiçbir zaman çocuğunuzun koltukta ayakta durmasına izin vermeyin ve kucağınızda tutmayınız.

Daha ileri yaşlardaki çocuklarda ağız koruyucular yaralanmaları engelleyebilir. Pek çok diş yaralanmaları jimnastik salonunda yada oyun alanında değil, yakınımızda olur; bu nedenle ağız koruyucu, arka bahçenizde bile olsa sert oyunlar sırasında takılmalıdır.

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...

64 Ada Kamelya 2-3 D:1-2-4
Ataşehir / İSTANBUL / TR
e-mail: ortodontist@ortodontist.com
www.ortodontist.com
Tel: 0216 456 02 56 pbx
Fax: 0216 455 26 49

www.ortodontist.com



BÜYÜYEN ÇOCUKTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ORTODONTİK PROBLEMLER



Yer Darlığı



Diş Aralarının Fazla Açık Olması



Alt Çenenin Geride Kalması



Ters Kapanış



Derin Kapanış



Açık Kapanış



Dil İtmi



Parmak Emme ve Açık Kapanış



Üst Çene Darlığı



Üst Çenenin İleri İtmi



Çapraşıklık ve Diastema



Parmak Emme

Çocuğunuzda, yukarıda belirttiğimiz problemleri fark ederseniz, ortodontiste başvurmalısınız.

- Erken veya geç süt dişi kaybı
- Çiğnemedede zorluk
- Ağız solunumu
- Çenelerin açılıp kapanma esnasında ses çıkarması
- Konuşma zorlukları
- Yanakların ısırılması veya dişlerin damağa çarpması
- Yüzde simetri bozukluğu
- Dişlerin anormal sıkılması

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...

Daha fazla bilgi için www.ortodontist.com ziyaret ediniz.



©

Çocuğunuz 7 Yaşını geçirmeden ilk Ortodonti Muayenesini olmalıdır.

Sebepleri

- Süt dişleri henüz ağızda iken; çene büyümesi veya sürmekte olan dişler ile ilgili problemleri Ortodonti Uzmanı veya diş hekimi tespit edebilir.
- Çocuğunuzun dişleri sizce düzgün olmasına rağmen, Ortodonti Uzmanının fark edeceği bir problemi olabilir.
- Çocuğunuzun ortodontik amaçlı kontrole getirdiğinizde, herhangi bir problemi olmadığı ortaya çıkabilir. Ancak büyüme ile birlikte ortaya çıkabilecek bir problem teşhis edilirse, Ortodontistiniz sizi izlemeye alacaktır. Amaç; uygun zamanda müdahale ederek, ideal sonucu yakalamaktır.
- Erken dönem müdahale sayesinde problemler daha da büyümeden, daha kısa süreli ve daha basit müdahalelerle çözülebilir.
- Erken tedavi sayesinde;
 - Çene büyümesini yönlendirme
 - Dişlek tabir edilen ağızlarda düşme sonucu olabilecek diş kırılmalarının, dişin yuvasından çıkmasının engellenmesi
 - Kötü alışkanlıkların giderilmesi
 - Dişlerin daha düzgün hale getirilmesi
 - Düzgün ve güzel bir yüz yaratılması sağlanır.

Erken Müdahale sayesinde çocuğunuza, sağlıklı ve güzel bir gülümseme sağlamış olacaksınız.

Çocuğunuz 7 Yaşını geçirmeden ilk Ortodonti Muayenesini olmalıdır.

Ortodonti Uzmanın görevi; en uygun zamanda, en uygun müdahale ile çocuğunuzun değişen ağız ve yüz yapısında en iyiye kavuşmasını sağlamaktır.

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...

64 Ada Kamelya 2-3 D:1-2-4
Ataşehir / İSTANBUL / TR
e-mail:ortodontist@ortodontist.com
www.ortodontist.com
Tel: 0216 456 02 56 pbx
Fax: 0216 455 26 49

www.ortodontist.com

